

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Podem ocorrer distúrbios gastrintestinais, dor de cabeça e reações alérgicas na pele (vermelhidão, inchaço e coceira). Também foram relatados enjôos, palpitações, hemorragias e queda de pressão arterial.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 7226001, se você precisar de mais orientações.

MS: 1.5400.0004

Farm. Responsável: Tânia R. Isquierdo Lopes Fam- CRF/SP nº 9762

Laboratório Vitalab Ltda.

Rua Nove de Novembro, 241/253

Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - CEP 02615-060

CNPJ 56.646.953/0001-86

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 0800 7726519

Venda sob prescrição médica

Esta bula foi atualizada conforme ofício enviado à empresa em 24/02/2012.



GINKGO ES® - 80 mg

Nomenclatura botânica oficial: *Ginkgo biloba*

Nomenclatura popular: ginko, ginkgo

Família: Ginkgoaceae

Parte da planta utilizada: folhas

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

APRESENTAÇÕES

Forma farmacêutica: Cápsula gelatinosa dura

Concentrações:

- 20 mg de extrato seco de *Ginkgo biloba* L. por cápsula gelatinosa dura (equivalente a 1,2 mg de terpenolactonas e 4,8 mg de ginkgoflavonóides).

- 80 mg de extrato seco de *Ginkgo biloba* L. por cápsula gelatinosa dura (equivalente a 4,8 mg de terpenolactonas e 19,2 mg de ginkgoflavonóides).

Apresentações:

GINKGO ES® - 20 mg: Cartuchos contendo blisters de alumínio plástico incolor com 45, 60 e 90 cápsulas.

GINKGO ES® - 80 mg: Cartuchos contendo blisters de alumínio plástico incolor com 45, 60 e 90 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

GINKGO ES® - 20 mg

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

Extrato seco *Ginkgo biloba* L.20 mg*

Excipientes (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e croscarmelose sódica) q.s.p. 300 mg

*Equivalente a 1,2 mg de terpenolactonas e 4,8 mg de ginkgoflavonóides.

GINKGO ES® - 80 mg

Cada cápsula gelatinosa dura contém:

Extrato seco *Ginkgo biloba* L.80 mg*

Excipientes (celulose microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio e croscarmelose sódica) q.s.p. 300 mg

*Equivalente a 4,8 mg de terpenolactonas e 19,2 mg de ginkgoflavonóides.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral como problemas de memória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, zumbidos, estágios iniciais de demências (como Alzheimer e demências mistas), além de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Aumenta o fluxo sanguíneo, com conseqüente melhora de oferta de oxigênio para as células, protegendo os tecidos dos danos da falta de oxigênio (hipóxia), além de inibir a agregação plaquetária.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve ser usado cuidadosamente em pacientes com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes e antiplaquetários. Este medicamento deve ser suspenso pelo menos três dias antes de procedimentos cirúrgicos.

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do produto.

Este medicamento não deve ser usado durante a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe ao seu médico se iniciar a amamentação durante o uso deste medicamento.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

INTERAÇÕES

A associação deste medicamento com anticoagulantes, antiplaquetários, anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e/ou agentes trombolíticos pode aumentar o risco de hemorragias.

Este medicamento pode diminuir a efetividade dos anticonvulsivantes e alterar os efeitos da insulina, aumentando a sua depuração.

Pode provocar mudanças no estado mental quando associado à buspirona ou *Hypericum perforatum*.

Potencializa o efeito dos inibidores da monoaminaoxidase e aumenta o risco dos efeitos colaterais da nifedipina.

Pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica quando associado aos inibidores da recaptção de serotonina e pode causar hipertensão em uso concomitante com os diuréticos tiazídicos.

A associação deste medicamento com omeprazol acarreta diminuição

de nível sérico do omeprazol.

A associação com trazodona pode trazer risco de sedação excessiva. Quando associado com risperidona e/ou fluoxetina há diminuição da disfunção sexual.

A associação com papaverina pode acarretar potencialização de efeitos terapêuticos e adversos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

GINKGO ES[®] deve ser guardado em locais com temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses, indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

GINKGO ES[®] apresenta-se como uma cápsula gelatinosa dura, contendo pó fino, de coloração parda clara e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ORAL.

GINKGO ES[®] - 20 mg:

Ingerir 3 (três) cápsulas, 3 (três) vezes ao dia (equivalente a 10,8 mg de terpenolactonas e 43,2 mg de ginkgoflavonóides) ou de acordo com a indicação médica.

GINKGO ES[®] - 80 mg:

Ingerir 1 (uma) cápsula, 2 (duas) a 3 (três) vezes ao dia (equivalente a 9,6 a 14,4 mg terpenolactonas e 38,4 a 57,6 mg de ginkgoflavonóides) ou de acordo com a indicação médica.

As cápsulas devem ser ingeridas com líquido, antes das refeições.

Este medicamento deve ser utilizado apenas pela via oral. O uso do GINKGO ES[®] por outra via, que não a oral, pode resultar na perda do efeito esperado do medicamento ou mesmo provocar danos à saúde.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.