

**COSENTYX™**  
secuquinumabe

## **APRESENTAÇÕES**

Cosentyx™ 150 mg/mL solução injetável – embalagens contendo 1 ou 2 canetas preenchidas.

## **VIA SUBCUTÂNEA USO ADULTO**

## **COMPOSIÇÃO**

Cada caneta preenchida de Cosentyx™ contém 150 mg de secuquinumabe em 1 mL de solução injetável.

Excipientes: trealose di-hidratada, histidina/cloridrato de histidina monoidratado, metionina, polissorbato 80, água para injetáveis.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

#### **Psoríase em placas**

Cosentyx™ é utilizado para tratar uma doença de pele denominada “psoríase em placas”. A psoríase em placas causa uma inflamação que afeta a pele. Cosentyx™ reduz a inflamação e outros sintomas da doença.

Cosentyx™ é utilizado em adultos com psoríase em placas moderada a grave.

#### **Artrite psoriática**

Cosentyx™ é utilizado para tratar uma condição conhecida como “artrite psoriática” quando a resposta ao tratamento anterior com medicamentos antirreumáticos modificadores do curso da doença (DMARDs) for inadequada. A condição é uma doença inflamatória das articulações, muitas vezes acompanhada pela psoríase. Cosentyx™ é administrado a você para reduzir os sinais e sintomas da artrite psoriática ativa, melhorar a função física e diminuir o dano estrutural de articulações envolvidas na doença.

#### **Espondilite anquilosante**

Cosentyx™ é utilizado para tratar uma doença conhecida como “espondilite anquilosante”, em pacientes que não tenham respondido adequadamente ao tratamento convencional. Esta doença afeta principalmente a coluna vertebral causando inflamação de suas articulações. Cosentyx™ é administrado a você para reduzir os sinais e sintomas da doença, incluindo a inflamação e melhorar a sua função física.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Cosentyx™ contém a substância ativa secuquinumabe. O secuquinumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano. Anticorpos monoclonais são proteínas que reconhecem e se ligam às proteínas específicas do organismo.

Ele pertence ao grupo de medicamentos denominado inibidores da interleucina (IL). Este medicamento funciona neutralizando a atividade de uma proteína denominada IL-17A, que está presente em níveis elevados em doenças como a psoríase, artrite psoriática e espondilite anquilosante.

Em pacientes com psoríase, artrite psoriática e espondilite anquilosante, o organismo produz quantidades elevadas de uma proteína denominada IL-17A. Isso pode causar sintomas como coceira, dor, descamação, inchaço e articulações doloridas.

Cosentyx™ neutraliza a IL-17A, reduzindo assim os sintomas da doença pela diminuição do processo de inflamação.

Caso você tenha dúvidas sobre como Cosentyx™ funciona ou porque este medicamento foi prescrito para você, pergunte ao seu médico, farmacêutico ou outro profissional da saúde.

Ao usar Cosentyx™ na psoríase, você será beneficiado ao obter melhoras rápidas e prolongadas no clareamento da pele e redução de sintomas como escamação, coceira e dor.

Na artrite psoriática, Cosentyx™ irá beneficiá-lo através da redução dos sinais e sintomas da doença, diminuindo o dano estrutural das articulações e melhorando a sua capacidade de fazer as atividades diárias normais.

Na espondilite anquilosante, Cosentyx™ irá beneficiá-lo através da redução dos sinais e sintomas da sua doença e melhorando sua função física.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Não use Cosentyx™**

**Caso você tenha apresentado reação alérgica** ao secuquinumabe ou a qualquer um dos outros componentes de Cosentyx™ (vide “Composição”).

Caso você acredite ser alérgico, peça orientação ao seu médico antes de usar Cosentyx<sup>TM</sup>.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Siga atentamente todas as instruções do médico. Elas podem diferir das informações gerais contidas nesta bula.

**Caso qualquer um dos itens abaixo se aplique a você, informe ao seu médico ou farmacêutico antes de usar Cosentyx<sup>TM</sup>:**

- Se você apresenta atualmente uma infecção, ou caso tenha apresentado infecções prolongadas ou recorrentes;
- Se você tem tuberculose;
- Se você alguma vez apresentou reação alérgica ao látex;
- Se você tem doença de Crohn;
- Se você recentemente recebeu ou for receber vacina durante o tratamento com Cosentyx<sup>TM</sup>.

**Interrompa o tratamento e informe ao seu médico ou farmacêutico imediatamente caso você apresente quaisquer um dos seguintes sintomas durante o tratamento com Cosentyx<sup>TM</sup>:**

Sinais ou sintomas de uma infecção possivelmente grave. Eles podem incluir:

- Febre, sintomas semelhantes à gripe, suores noturnos;
- Cansaço ou falta de ar, tosse que não passa;
- Calor, vermelhidão ou dor na pele, ou erupções cutâneas dolorosas com bolhas;
- Ardência com a água.

Sinais ou sintomas de uma reação alérgica. Eles podem incluir:

- Dificuldade de respirar ou engolir;
- Pressão arterial baixa, o que pode causar tontura ou atordoamento;
- Inchaço no rosto, lábios, boca ou garganta.

#### **Idosos (pessoas acima de 65 anos de idade)**

Cosentyx<sup>TM</sup> pode ser utilizado por pessoas com 65 anos de idade ou mais sem necessidade de ajuste da dose.

#### **Crianças e adolescentes (com menos de 18 anos de idade)**

Cosentyx<sup>TM</sup> não é recomendado para crianças e adolescentes (abaixo de 18 anos de idade), pois ele não foi estudado neste grupo.

#### **Gravidez e amamentação**

Informe ao seu médico antes de usar Cosentyx<sup>TM</sup>:

- Se você estiver grávida, acreditar que possa estar grávida ou estiver planejando ter um bebê;
- Cosentyx<sup>TM</sup> não é recomendado durante a gravidez, a não ser que os benefícios claramente superem os possíveis riscos;
- Se você estiver amamentando ou planejando amamentar. Cosentyx<sup>TM</sup> enquadra-se na categoria B de risco na gravidez.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **Uso de outros medicamentos (interações com outros medicamentos, incluindo vacinas ou medicamentos biológicos)**

Informe ao seu médico ou farmacêutico:

- Caso você esteja tomando, tenha recentemente tomado ou possa tomar quaisquer outros medicamentos;
- Caso você tenha recebido vacina recentemente ou se for receber uma vacina. Você não deve receber certos tipos de vacinas (vacinas com vírus vivos) durante o uso de Cosentyx<sup>TM</sup>.

**Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. Os médicos que acompanham pacientes sob imunossupressão devem estar alertas quanto à possibilidade de surgimento de doença ativa, tomando, assim, todos os cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

---

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cosentyx<sup>TM</sup> deve ser armazenado sob refrigeração (entre 2°C e 8°C), proteger da luz e não congelar.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Cosentyx<sup>TM</sup> solução para injeção é uma solução incolor ou levemente amarelada.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sempre use Cosentyx<sup>TM</sup> exatamente da forma recomendada pelo seu médico. Você deve verificar com seu médico, enfermeiro ou farmacêutico se não tiver certeza.

Cosentyx<sup>TM</sup> é administrado por meio de injeção sob a pele (por via subcutânea).

Você e seu médico devem decidir se você mesmo aplicará a injeção de Cosentyx<sup>TM</sup>.

É importante que você não tente aplicar a injeção até que tenha sido treinado por um médico, enfermeiro ou farmacêutico. Um cuidador também poderá aplicar a injeção de Cosentyx<sup>TM</sup> em você após treinamento adequado.

Para instruções detalhadas sobre como injetar Cosentyx<sup>TM</sup>, vide "**Instruções de uso e manuseio**".

### **Qual a quantidade de Cosentyx<sup>TM</sup> que deve ser usada**

Seu médico decidirá a quantidade de Cosentyx<sup>TM</sup> que você precisa.

#### **Psoríase em placas**

A dose recomendada é de 300 mg por injeção subcutânea, com administração inicial nas semanas 0, 1, 2 e 3, seguida por administração de manutenção mensal com início na semana 4. Cada dose de 300 mg é administrada na forma de duas injeções subcutâneas de 150 mg.

#### **Artrite Psoriática**

A dose recomendada é de 150 mg por injeção subcutânea com administração inicial nas semanas 0, 1, 2, 3, seguida por administração de manutenção mensal com início na semana 4.

Para os pacientes com psoríase moderada a grave concomitante, a administração recomendada é de 300 mg por injeção subcutânea, com administração inicial nas semanas 0, 1, 2 e 3, seguida por administração de manutenção mensal com início na semana 4. Cada dose de 300 mg é administrada em duas injeções subcutâneas de 150 mg.

#### **Espondilite anquilosante**

A dose recomendada é 150 mg por injeção subcutânea com administração inicial nas semanas 0, 1, 2 e 3, seguida por administração de manutenção mensal com início na semana 4.

#### **Por quanto tempo usar Cosentyx<sup>TM</sup>**

Este é um tratamento a longo prazo. Seu médico monitorará regularmente sua doença para verificar se o tratamento está apresentando o efeito desejado.

Continue a usar o Cosentyx<sup>TM</sup> pelo tempo que seu médico indicar.

#### **Se você interromper o uso de Cosentyx<sup>TM</sup>**

Não é perigoso interromper o uso do Cosentyx<sup>TM</sup>. No entanto, caso você interrompa, os sintomas de sua psoríase, artrite psoriática e espondilite anquilosante podem voltar.

## **INSTRUÇÕES DE USO DE COSENTYX<sup>TM</sup> SENSOREADY<sup>TM</sup> SOLUÇÃO PARA INJEÇÃO EM CANETA PREENCHIDA**



### Caneta Cosentyx™ SensoReady™ de 150 mg

Solução para injeção em uma caneta preenchida

**Secuquinumabe**

Instruções de uso para o paciente




#### Leia **TODAS** estas instruções passo a passo antes de aplicar a injeção.

Estas instruções são para ajudá-lo a aplicar a injeção de forma correta utilizando a caneta Cosentyx™ SensoReady™.

É importante que você não tente aplicar a injeção até que tenha sido treinado por um médico, enfermeiro ou farmacêutico.

#### Sua caneta Cosentyx™ SensoReady™ :



- a. Agulha
- b. Proteção da agulha
- c. Tampa
- d. Janela de inspeção
- e. Protetor interno da agulha

Caneta Cosentyx™ SensoReady™ mostrada com a tampa removida. **Não** remova a tampa até que você esteja pronto para aplicar a injeção.

Armazene o cartucho com a caneta Cosentyx™ SensoReady™ na geladeira entre 2°C e 8°C **fora do alcance de crianças**.

Não **congele** a caneta Cosentyx™ SensoReady™.

Não **agite** a caneta Cosentyx™ SensoReady™.

Não use a caneta Cosentyx™ SensoReady™ caso ela tenha **caído** com a tampa removida.

Para uma aplicação mais confortável da injeção, retire a caneta Cosentyx™ SensoReady™ da geladeira **15 a 30 minutos antes de aplicar a injeção**, para permitir que ela atinja a temperatura ambiente.


#### Do que mais você precisa para a injeção:

Incluso na embalagem:


- Uma caneta Cosentyx™ SensoReady™ nova e não utilizada.

Não incluso na embalagem:

- Chumaços de algodão embebidos em álcool.
- Bolinhas de algodão ou gaze.
- Recipiente para descarte de objetos perfurocortantes.




## Antes da injeção




### 1 - Verificações de segurança importantes antes de se aplicar a injeção:

- O líquido deve estar límpido. Sua cor poderá variar de incolor a levemente amarelada.
- **Não use** caso o líquido contenha partículas facilmente visíveis, esteja turvo ou visivelmente marrom. Você poderá observar uma pequena bolha de ar, o que é normal.
- **Não use** a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> caso a **data de validade** tenha passado.
- **Não use** caso o **lacre de segurança** esteja rompido.
- Entre em contato com o farmacêutico caso a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> não esteja de acordo com quaisquer dessas orientações.




### 2a - Escolha o local da injeção:

- O local recomendado é a parte da frente das coxas. Você também pode fazer a aplicação na parte inferior do abdômen, mas **não** na área de 2 polegadas (aproximadamente 5,08 cm) ao redor do umbigo.
- Escolha um local diferente cada vez que você for aplicar uma injeção.
- Não injete nas áreas sensíveis da pele, com hematomas, vermelhas, com descamação ou enrijecidas. Evite áreas com cicatrizes ou estrias.



### 2b - Exclusivamente para Cuidadores e Profissionais de Saúde:


Caso um **cuidador** ou **profissional de saúde** aplique a injeção em você, ele poderá também aplicar a injeção na parte superior de fora do seu braço.



### 3 - Higienização do local de injeção:


- Lave as mãos com água quente e sabonete.
- Utilizando movimentos circulares, limpe o local da injeção com um chumaço de algodão embebido em álcool. Deixe secar antes de aplicar a injeção.
- Não toque novamente na área higienizada antes da aplicação da injeção.

## Sua injeção



### 4 - Remoção da tampa:

- Remova a tampa apenas quando você estiver pronto para usar a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup>.
- Gire a tampa para fora na direção das setas.
- Assim que for removida, jogue a tampa fora. **Não tente acoplar novamente a tampa.**
- Use a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> em até 5 minutos após a remoção da tampa.



### 5 - Como segurar a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup>:

- Segure a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> em um ângulo de 90 graus em relação ao local da injeção higienizado.



Correto

Incorreto




### VOCÊ DEVE LER ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE APLICAR A INJEÇÃO.

Durante a injeção você ouvirá **2 cliques altos**.


O **1º clique** indica que a injeção foi iniciada. Vários segundos depois, um **2º clique** indicará que sua injeção está **quase** no fim.

Você deve continuar segurando a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> firmemente contra a pele até observar um **indicador verde** preencher a janela de inspeção e parar de se mover.



### 6 - Iniciando sua Injeção:

- Pressione a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> firmemente contra a pele para iniciar a injeção.
- O **1º clique** indica que a injeção foi iniciada.
- **Continue segurando** a caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> contra a sua pele.
- O **indicador verde** mostrará o progresso da injeção.



### 7 - Completando sua injeção:


- Escute o **2º clique**. Isso indica que a injeção está **quase** concluída.
- Observe o **indicador verde** preencher a janela de inspeção e parar de se mover.
- A caneta Cosentyx<sup>TM</sup> SensoReady<sup>TM</sup> pode então ser removida.

### Após a injeção



#### 8 - Observe o indicador verde preencher a janela de inspeção:

- Isso significa que o medicamento foi administrado. Entre em contato com seu médico caso o indicador verde não esteja visível.
- Poderá haver uma pequena quantidade de sangue no local da injeção. Você pode pressionar uma bolinha de algodão ou gaze sobre o local da injeção e segurá-la por 10 segundos. Não esfregue o local da injeção. Você pode cobrir o local da injeção com um pequeno curativo adesivo, se necessário.



#### 9 - Descarte da caneta Cosentyx™ SensoReady™:

- Descarte a caneta Cosentyx™ SensoReady™ em um recipiente para descarte de objetos perfurocortantes (ou seja, um recipiente resistente à perfurações e que pode ser fechado, ou similar).
- Nunca tente reutilizar a caneta Cosentyx™ SensoReady™.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você se esqueça de injetar uma dose de Cosentyx™, injete a próxima dose assim que você se lembrar. Então converse com seu médico para discutir sobre quando você deverá injetar a próxima dose.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Assim como acontece com todos os medicamentos, os pacientes tratados com o Cosentyx™ podem apresentar reações adversas, embora nem todos as apresentem.

INTERROMPA o uso do Cosentyx™ e procure assistência médica imediatamente caso você apresente quaisquer dos seguintes sinais, os quais indicam reação alérgica:

- Dificuldade de respirar ou engolir;
- Inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta;
- Coceira grave na pele, com erupções vermelhas ou inchaços.

Outras possíveis reações adversas incluem as relacionadas abaixo. A maioria dessas reações adversas são leves a moderadas. Caso essas reações adversas se tornem graves, informe ao seu médico, farmacêutico ou profissional da saúde.

**Algumas reações adversas são muito comuns** (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- Infecções do trato respiratório superior, com sintomas tais como dor de garganta ou nariz entupido (nasofaringite, rinite);

**Algumas reações adversas são comuns** (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- Afta (herpes oral);
- Diarreia;
- Erupções cutâneas com coceira (urticária);
- Nariz escorrendo (rinorreia).

**Algumas reações adversas são incomuns** (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- Afta oral (candidíase oral);
- Sinais de níveis baixos de glóbulos brancos, como febre, dor de garganta ou feridas na boca em decorrência de infecções (neutropenia);

- Pé de atleta (*Tinea pedis*);
- Secreções nos olhos, com coceira, vermelhidão e inchaço (conjuntivite).

Se você notar qualquer outra reação adversa não mencionada nesta bula, informe ao seu médico ou farmacêutico.

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Se você acidentalmente injetar Cosentyx<sup>TM</sup> em uma quantidade maior ou mais cedo do que o seu médico orientou, informe ao seu médico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

MS – 1.0068.1122

Farm. Resp.: Flavia Regina Pegorer – CRF-SP 18.150

### **Importado por:**

Novartis Biociências S.A.  
Av. Prof. Vicente Rao, 90  
São Paulo - SP  
CNPJ: 56.994.502/0001-30  
Indústria Brasileira

**Fabricado por:** Novartis Pharma Stein AG, Stein, Suíça.

<sup>TM</sup> = Marca depositada em nome de Novartis AG, Basileia, Suíça.

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 30/05/2016.**



BPL 09.12.15  
VP2